ЛП-№(010601)-(РГ-RU) от 19.06.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 16.06.2025 № 14813
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Листок-вкладыш - информация для пациента
Йод, 5 %, раствор для наружного применения спиртовой
Действующее вещество: йод.

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача, или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша:

1. Что из себя представляет препарат Йод, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Йод.
3. Применение препарата Йод.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Йод.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Йод, и для чего его применяют

Препарат Йод, 5%, раствор для наружного применения спиртовой содержит в качестве действующего вещества йод и относится к группе антисептиков и дезинфицирующих средств, оказывает бактерицидное действие.

Показания к применению

Препарат Йод показан к применению у взрослых и детей с 0 до 18 лет при воспалительных и инфекционных заболеваниях кожи, ссадинах, порезах, микротравмах, ранах; воспалительных инфильтратах; обработке краев ран, кожи перед проведением инъекций, пункций, катетеризации.

Способ действия

Препарат Йод при нанесении на обширные поверхности кожи оказывает резорбтивное действие (всасывается и активно влияет на обмен веществ), обладает протеолитическим действием (расщепляет белки на аминокислоты). Оказывает бактерицидное действие.
Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Йод

Противопоказания

Не применяйте препарат Йод если у Вас:

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 16.06.2025 № 14813
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

- аллергия на йод или на любой другой компонент препарата (перечисленный в разделе 6 листка-вкладыша);
- тиреотоксикоз;
- герпетиформный дерматит.

Особые указания и меры предосторожности
Перед применением препарата Йод проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.
Свет и температура выше 40 °С ускоряют распад активного йода. Препарат должен иметь темно-коричневую окраску. Обесцвечивание раствора свидетельствует о разрушении комплекса с переходом активного йода в йодид-ион и снижении эффективности препарата. Несовместим с ферментами, восстановителями и щелочами. Щелочная или кислая среда, присутствие жира, гноя, крови ослабляют антисептическую активность. Следует избегать попадания в глаза.

Другие препараты и препарат Йод
Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.
Препарат Йод фармацевтически несовместим с эфирными маслами, растворами аммиака, белой осадочной ртутью (ртути амидохлоридом) – образуется взрывчатая смесь.

Беременность, грудное вскармливание
Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.
Беременность
Препарат Йод можно применять в период беременности.
Грудное вскармливание
Препарат Йод можно применять в период грудного вскармливания.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами
Препарат не влияет на способность управлять транспортом или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

3. Применение препарата Йод
Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача, или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза
Взрослые
Смазывают пораженные или подлежащие обработке участки кожи.
При обработке операционного поля кожу дважды протирают стерильным марлевым тампоном, смоченным в растворе. Общее время обработки 4-6 мин.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 16.06.2025 № 14813
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Применение у детей и подростков
Режим дозирования у детей в возрасте от 0 до 18 лет не отличается от режима дозирования для взрослых.

Путь и способ введения
Наружно.

Если вы применили препарата Йод больше, чем следовало
Если Вы или Ваш ребенок случайно применили препарата больше, чем следует, незамедлительно обратитесь к врачу. Вам или Вашему ребенку будет назначена симптоматическая терапия.
Симптомы передозировки: раздражение, ожоги, возможно отравление йодом (йодизм), симптомами которого являются отеки, тошнота, рвота, гнойнички на коже, насморк, конъюнктивит, повышение температуры тела, боли в суставах.
При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу, или работнику аптеки, или медицинской сестре.

4. Возможные нежелательные реакции
Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Йод может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.
Наиболее серьезные нежелательные реакции
Прекратите применение препарата и немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у Вас появились следующие серьезные нежелательные реакции:
• реакции гиперчувствительности (аллергическая реакция);
• внезапный отек рта/горла и слизистых оболочек, может распространяться на гортань, вызывающий затрудненное глотание и/или дыхание, охриплость голоса и лающий кашель (ангионевротический отек);
• при длительном применении на обширных поверхностях возможны отеки, тошнота, рвота, гнойнички на коже, насморк, конъюнктивит, повышение температуры тела, боли в суставах, являющиеся симптомами отравления йодом (йодизм).
Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при применении препарата Йод:
• раздражение в месте нанесения;
• насморк, заложенность носа (ринит);
• зуд, покраснение кожи с появлением пузырей и волдырей (крапивница);
• повышенное слюнотечение;
• слезотечение;
• угревая сыпь.

Сообщение о нежелательных реакциях
Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 16.06.2025 № 14813
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщения государства – члена Евразийского экономического союза.
Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1
Телефон: +7 8005509903
Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru
Сайт: www.roszdravnadzor.gov.ru

5. Хранение препарата Йод

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.
Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на этикетке флакона после слова «до» и на картонной пачке после слов «Годен до:».
Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.
Хранить в оригинальной упаковке (флакон в пачке или флаконы в коробке, или бутылки оранжевого стекла, или ПЭТ бутылки в коробке, или матовые канистры), при температуре не ниже 0°С для защиты от света.
Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Йод содержит:

Действующим веществом является йод.
В 1 мл раствора для наружного применения спиртового 5 % содержится 0,05 г йода.
Прочими вспомогательными веществами являются: калия йодид, этанол (спирт этиловый) 95 % и вода очищенная.

Внешний вид препарата Йод и содержимое упаковки

Раствор для наружного применения спиртовой.
Прозрачная жидкость красно-коричневого цвета с характерным запахом.
По 10 мл, 15 мл, 25 мл, 40 мл, 50 мл или 100 мл во флаконах/флаконах-капельницах оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренных пробками из полиэтилена высокой плотности или низкой плотности, или смеси полиэтилена высокой плотности и низкой плотности и крышками навинчиваемыми из полиэтилена высокой плотности или низкой плотности, или смеси полиэтилена высокой плотности и низкой плотности;
или крышками навинчиваемыми с уплотнительным элементом из полиэтилена высокой плотности или низкой плотности, или смеси полиэтилена высокой плотности и низкой плотности. Допускается каждый флакон/флакон-капельницу дополнительно комплектовать пробкой-роллером из полиэтилена высокой плотности или низкой плотности, или смеси полиэтилена высокой плотности и низкой плотности или лопаточкой/кисточкой.
По 10 мл, 15 мл во флаконах-роллерах оранжевого стекла, укупоренных пробками-роллерами из полиэтилена высокой плотности или низкой плотности, или смеси

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 16.06.2025 № 14813
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

полиэтилена высокой плотности и низкой плотности и крышками навинчиваемыми из полиэтилена высокой плотности или низкой плотности, или смеси полиэтилена высокой плотности и низкой плотности.

Каждый флакон/флакон-капельницу или флакон-роллер вместе с листком-вкладышем помещают в пачку картонную.

Упаковка для стационаров. По 20, 24, 40, 54, 66, 70, 80 или 120 флаконов/флаконов-капельниц без пачек с равным количеством листков-вкладышей помещают в групповую упаковку.

По 0,95 кг в бутылки оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные навинчиваемыми пластмассовыми крышками с уплотнительными прокладками;

или по 4,5 кг в бутылки из полиэтилентерефталата с винтовой горловиной, укупоренные навинчиваемыми пластмассовыми крышками с уплотнительными прокладками, две бутылки помещают в пачку картонную;

или по 4,5 кг или 10 кг в матовые канистры из полиэтилена низкого давления, укупоренные навинчиваемыми пластмассовыми крышками с уплотнительными прокладками.

Бутылки/канистры снабжают листками-вкладышами (наклеивают или вкладывают в специальный кармашек).

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация
ООО «ДАНСОН-РУ»,
142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, стр. 49, пом.1, ком. 220.
Тел.: +7 (495) 580-30-60.

Производитель

Российская Федерация
Закрытое акционерное общество «Ярославская фармацевтическая фабрика»,
150030, Ярославская область, г. Ярославль, ул. 1-я Путевая, д. 5.
Тел.: +7 (4852) 44-38-56.
Электронная почта: farmfab@yaroslavl.ru

За любой информацией о препарате, а также в случае возникновения претензий следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация
Закрытое акционерное общество «Ярославская фармацевтическая фабрика»
Адрес: 150030, Ярославская область, г. Ярославль, ул. 1-я Путевая, д. 5.
Тел.: +7 (4852) 44-38-56.
Электронная почта: farmfab@yaroslavl.ru

Листок-вкладыш пересмотрен:

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте Союза https://eec.eaeunion.org/