

## ИНСТРУКЦИЯ

### ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ЛЕВЗЕИ ЭКСТРАКТ ЖИДКИЙ

**Регистрационный номер:**

**Торговое наименование:** Левзеи экстракт жидкий

**Лекарственная форма:** Экстракт жидкий для приема внутрь

#### **Состав**

Для приготовления 1000 мл препарата необходимо:

Рапontiкума сафлоровидного корневищ с корнями - 1000 г

Спирт этиловый (этанол) 70% - достаточное количество для получения 1 л экстракта.

#### **Описание**

Жидкость красновато-коричневого цвета. В процессе хранения возможно выпадение осадка.

#### **Фармакотерапевтическая группа**

Общетонизирующие средства

**Код АТХ:** A13A

#### **Фармакологические свойства**

Оказывает общетонизирующее действие, повышает работоспособность.

#### **Показания к применению**

Физическое и умственное переутомление, астеническое состояние.

#### **Противопоказания**

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, артериальная гипертензия (повышенное артериальное давление), повышенная возбудимость, эпилепсия, судорожный синдром, аритмия, хронический алкоголизм, нарушение сна, острые инфекционные заболевания, хронические заболевания печени и почек; беременность, период лактации, детский возраст до 12 лет.

#### **С осторожностью**

Заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, детский возраст старше 12 лет, пациенты со склонностью к развитию лекарственной зависимости, эпилепсия.

#### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Применение препарата противопоказано во время беременности и в период грудного вскармливания.

### **Способ применения и дозы**

Внутрь, до еды в первой половине дня, развести в небольшом количестве воды (примерно 1/3 стакана). Перед применением необходимо взбалтывать препарат во флаконе. Взрослым и детям с 12 лет по 20-30 капель 3 раза в день. Курс лечения 30-40 дней. Целесообразность проведения повторного курса определяется врачом. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

### **Побочное действие**

Возможны аллергические реакции, головная боль, повышение артериального давления, нарушение сна, раздражительность, диспепсия. Если любые из указанных в инструкции нежелательных реакций усугубляются, или Вы заметили любые другие нежелательные реакции, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

### **Передозировка**

#### Симптомы

При применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможно усиление дозозависимых побочных эффектов.

#### Лечение

Симптоматическое

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Усиливает действия стимуляторов центральной нервной системы, является антагонистом лекарственных средств, угнетающих центральную нервную систему (в том числе нейролептиков, барбитуратов, анксиолитиков, противоэpileптических лекарственных средств). При одновременном применении с дигоксином возможно повышение концентрации в плазме крови последнего; с гипогликемическими лекарственными средствами (в том числе инсулин) и антикоагулянтами возможно усиление эффекта. Если Вы принимаете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом.

### **Особые указания**

Препарат не следует применять во второй половине дня во избежание нарушений сна.

#### Вспомогательные вещества

Препарат содержит не менее 62% спирта этилового (этанола).

Максимальная разовая доза препарата (30 капель) содержит 0,32 г абсолютного этилового спирта, максимальная суточная доза препарата (90 капель) содержит 0,87 г абсолютного этилового спирта.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

В период применения препарата следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управлении автотранспортом, работа с механизмами).

**Форма выпуска**

Экстракт жидкий для приема внутрь.

По 25, 50 мл во флаконы-капельницы ОС с пробкой-капельницей и навинчиваемой крышкой.

По 25, 30, 50 мл во флаконы ОС с винтовой горловиной, укупоренные пластмассовыми пробками и навинчиваемыми крышками.

Каждый флакон-капельницу или флакон вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

**Условия хранения**

В сухом, защищенном от света месте, при температуре от +15 до +25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

3 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

**Владелец регистрационного удостоверения**

Российская Федерация

ООО «Камелия НПП»

Юридический адрес: 141865, Московская обл., г.о. Дмитровский, рп. Некрасовский, ул. Лесная, д. 32, стр.3.

Тел. +7(495) 221-92-02

**Производитель**

Российская Федерация

ООО «Камелия НПП»

Адрес производственной площадки: 141055, Московская обл., г. Лобня, городок Научный, д. 33, корп.3.

**Организация, принимающая претензии от потребителей**

Российская Федерация

ООО «Камелия НПП»,

141865, Московская обл., г.о. Дмитровский, рп. Некрасовский, ул. Лесная, д. 32, стр.3.

Тел. +7(495) 221-92-02

kamelia@kamelia.ru